

BIJLAGE 2C: BEOORDELINGSFORMULIER OPEN KOEMELKPROVOCATIE

Naam kind

Geboortedatum

Testdatum

Type testvoeding

	Tijd uur min	Klacht(en)
Dosis 1		
Dosis 2		
Dosis 3		
Dosis 4		

Samenvatting reacties op de testdag

- geen verschijnselen
 wel verschijnselen na dosis nummer

Medicatie gegeven? nee ja antihistaminicum
 adrenaline

Lichamelijk onderzoek aan einde testdag

Naam beoordelaar

Algemene indruk

Hoofd/hals

Longen

Huid (*TIS-score*)

Tabel 2. Samenhang tussen de ernst van het eczeem, de scores van de afzonderlijke componenten van het eczeem en de 'three item severity (TIS)-score

ernst eczeem	Erytheem	Oedeem	Excoriaties	TIS-score
mild	geen-licht (0,1)	geen-weinig (0.1)	geen-gering (0,1)	1,2
matig	geen-matig (0,2)	geen-matig (0-2)	krabeffecten (0-2)	3-5
ernstig	fors (2,3)	oedeem/papels (2,3)	zeer duidelijke krabeffecten (2,3)	6-9

Toelichting: mild eczeem=maximale TIS-score kan 2 zijn, matig eczeem=maximale TIS-score kan 5 zijn, ernstig eczeem=maximale TIS-score kan 9 zijn. Allerlei varianten per component als onderdeel van de TIS-score zijn mogelijk, afhankelijk van de ernst (0-3) met steeds 3 als maximum.

Mild eczeem licht erytheem (roodheid), geen/weinig oedeem en geen/geringe krabeffecten

Matig eczeem matig erytheem, licht oedeem en wel enige krabeffecten

Ernstig eczeem fors erytheem, oedeem/papels met duidelijke krabeffecten

Te ondernemen acties:

- Belafsprak met ouders na 48 uur.
- Symptoomscoreformulier voor thuis meegeven.
- Check bij de ouders of ze weten wat ze moeten doen bij reacties thuis (contactgegevens).
- Check bij de ouders of ze het koemelkvrjdieet nog aanhouden.
- Voorlopige uitslag provocatie in status noteren.

Telefonische controle na 48 uur

Datum

Tijdstip

Naam arts/verpleegkundige

Indien ja, specificeren

- | | | |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| Neus/ogen | <input type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ja |
| Longen | <input type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ja |
| Huid | <input type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ja |
| Andere | <input type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ja |

Wanneer zijn deze klachten opgetreden (hoeveel uren na provocatie)?

.....

Medicatie veranderd sinds laatste provocatie? Indien ja, specificeren.

.....

Objectiveren symptomen (bij symptomen binnen 48 uur)

Datum

Tijdstip

Naam arts/verpleegkundige

Indien ja, specificeren

Neus/ogen nee ja

Longen nee ja

Huid nee ja

Andere nee ja

Beoordeling provocatie

positief

negatief

dubieus of onbeslist

Toelichting

Te ondernemen acties

als open provocatietest negatief is herintroductie koemelk

als open provocatie test dubieus of positief is DBPGVP