

Addendum: aanpassing indicatoren n.a.v. eerste herziening (2019)

Naar aanleiding van de eerste herziening van de JGZ-richtlijn "Astma" in 2019 zijn de volgende wijzigingen van kracht geworden:

- Indicator "Signalering passief roken" wordt vervangen door indicator "Vaststellen rookprofiel" (zie onder).
- Indicator "Voorlichting passief roken" vervalt.
- Indicator "Signaleren piepen en benauwdheid" is aangepast (zie onder).

Vaststellen rookprofiel	
Operationalisatie	% jeugdigen waarbij bij het eerste contact (bijvoorbeeld tijdens het zuigelingenhuisbezoek) is gevraagd of de ouders/verzorgers in de afgelopen zeven dagen hebben gerookt, of er in de verdere omgeving van de jeugdige wordt gerookt en of de ouders in het half jaar voor of tijdens de zwangerschap hebben gerookt.
Teller	Aantal jeugdigen waarbij bij het eerste contact is gevraagd of de ouders/verzorgers in de afgelopen zeven dagen hebben gerookt, of er in de verdere omgeving van de jeugdige wordt gerookt en of de ouders in het half jaar voor of tijdens de zwangerschap hebben gerookt.
Noemer	Totaal aantal jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar in zorg.
Gegevensbron	Registratiemogelijkheid in de BDS van het digitaal dossier JGZ.
Definities en Toelichting	In de richtlijn wordt geadviseerd om Bij het eerste contact (bijvoorbeeld tijdens het zuigelingenhuisbezoek) het rookprofiel in kaart te brengen. Het vermijden van blootstelling aan tabaksrook (eerste-, tweede- en derdehands rook, zowel tijdens de zwangerschap als daarna) is de belangrijkste maatregel ter preventie van luchtwegklachten waaronder astma. Als blijkt dat de ouder(s) rookt (roken) dan wordt het onderwerp bij voorkeur besproken volgens de methode "Rookvrij Opgroeien".

Signaleren piepen, kortademigheid/ benauwdheid, nachtelijk hoesten	
Operationalisatie	% jeugdigen waarbij naar piepen, kortademigheid/benauwdheid en nachtelijk hoesten is gevraagd
Teller	Aantal jeugdigen waarbij naar piepen, kortademigheid/benauwdheid en nachtelijk hoesten is gevraagd
Noemer	Totaal aantal jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in zorg die niet voor verschijnselen van astma onder behandeling zijn van de huisarts of kinderarts
Gegevensbron	Registratiemogelijkheden in de BDS van het digitaal dossier JGZ
Definities en Toelichting	In de richtlijn wordt piepen gedefinieerd als: een piepend geluid bij uitademing. Benauwdheid of dyspnoe wordt gedefinieerd als: Sensatie dat het moeite kost om voldoende lucht te krijgen, moeite met ademen, beklemd gevoel op de borst. De richtlijn adviseert tijdens de reguliere anamnese na te gaan of de jeugdige luchtwegklachten heeft. Dit wordt gedaan door te vragen naar piepen, kortademigheid/benauwdheid en nachtelijk hoesten. Bij aanwezigheid van één of meer van deze luchtwegklachten wordt overwogen of er bij de jeugdige sprake kan zijn van astma en worden een voor astma specifieke anamnese en een lichamelijk onderzoek verricht. In de JGZ 0-18 jaar wordt vaak gewerkt met signaleringsvragenlijsten op basis waarvan risicojeugdigen worden geselecteerd voor een consult. In dat geval is het voldoende als de organisatie aangeeft: a) of er in de signaleringsvragenlijst wordt gevraagd naar

	piepen, kortademigheid/ benauwdheid en nachtelijk hoesten en b) of een positief antwoord aanleiding is voor nader onderzoek.
--	--