

BIJLAGE 2B: BEOORDELINGSFORMULIER DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTRO- LEERDE KOEMELKPROVOCATIE

Het formulier voor zowel testdag 1 als testdag 2 invullen.

TESTDAG 1

TESTDAG 2

Naam kind

Geboortedatum

Testdatum

Type testvoeding

Symptoomregistratie

Voorbeeld

Symptomen	Tijdstip							
	dosis 1	reactie	dosis 2	reactie	dosis 3	reactie	dosis 4	reactie
	08.45		09.15		09.45		10.15	
Jeuk		09.02						
Urticaria buik								10.20

Symptomen	Tijdstip							
	dosis 1	reactie	dosis 2	reactie	dosis 3	reactie	dosis 4	reactie

Symptomen kunnen zijn:

- Huid** jeuk, roodheid, lokale urticaria, gegeneraliseerde urticaria, zwelling, overige.
- Gastro-intestinaal** angio-oedeem van de lippen, tong en gehemelte, jeuk in de mond, (krampende) buikpijn, misselijkheid, spugen, diarree, overige.
- Respiratoir** neusobstructie, niezen, conjunctivitis, loopneus, gevoel van zwelling keel, stridor/heesheid, hoesten, moeilijk slikken, benauwdheid, astma aanval, overige.
- Cardiovasculair** tachycardie, slap worden, hypotensie, verminderd bewustzijn, acute gedragsverandering, overige.

Samenvatting reacties op de testdag

- geen verschijnselen
- wel verschijnselen na dosis nummer

- Medicatie gegeven?** nee ja antihistaminicum
 adrenaline

Lichamelijk onderzoek aan einde testdag

- Naam beoordelaar
- Algemene indruk
- Hoofd/hals
- Longen
- Huid (TIS-score)

Tabel 2. Samenhang tussen de ernst van het eczeem, de scores van de afzonderlijke componenten van het eczeem en de 'three item severity (TIS)-score

ernst eczeem	Erytheem	Oedeem	Excoriaties	TIS-score
mild	geen-licht (0,1)	geen-weinig (0.1)	geen-gering (0,1)	1,2
matig	geen-matig (0,2)	geen-matig (0-2)	krabeffecten (0-2)	3-5
ernstig	fors (2,3)	oedeem/papels (2,3)	zeer duidelijke krabeffecten (2,3)	6-9

Toelichting: mild eczeem=maximale TIS-score kan 2 zijn, matig eczeem=maximale TIS-score kan 5 zijn, ernstig eczeem=maximale TIS-score kan 9 zijn. Allerlei varianten per component als onderdeel van de TIS-score zijn mogelijk, afhankelijk van de ernst (0-3) met steeds 3 als maximum.

Mild eczeem licht erytheem (roodheid), geen/weinig oedeem en geen/geringe krabeffecten

Matig eczeem matig erytheem, licht oedeem en wel enige krabeffecten

Ernstig eczeem fors erytheem, oedeem/papels met duidelijke krabeffecten

Te ondernemen acties:

- Belafpraak met ouders na 48 uur.
- Symptoomscoreformulier voor thuis meegeven.
- Check bij de ouders of ze weten wat ze moeten doen bij reacties thuis (contactgegevens).
- Check bij de ouders of ze het koemelkvrije dieet nog aanhouden.
- Voorlopige uitslag provocatie in status noteren.

Telefonische controle na 48 uur

Datum

Tijdstip

Naam arts/verpleegkundige

Indien ja, specificeren

Neus/ogen nee ja

Longen nee ja

Huid nee ja

Andere nee ja

Wanneer zijn deze klachten opgetreden (hoeveel uren na provocatie)?

.....

Medicatie veranderd sinds laatste provocatie? Indien ja, specificeren.

.....

Objectiveren symptomen (bij symptomen binnen 48 uur)

Datum

Tijdstip

Naam arts/verpleegkundige

Indien ja, specificeren

Neus/ogen nee ja

Longen nee ja

Huid nee ja

Andere nee ja

Conclusie provocatiedag

Provocatie is reglementair afgerond (ten minste 75% van de laatst gegeven dosis gedronken):

- ja
 - er is een objectieve reactie opgetreden
 - er zijn herhaalde of persisterende subjectieve reacties opgetreden
 - er is geen reactie opgetreden
- nee
 - het kind weigerde de voeding volledig te drinken
 - de provocatie is gestaakt op verzoek van de ouders
 - anders,

Beoordeling provocatie

- positief
- negatief
- dubieus

Toelichting

.....
.....

EINDBEOORDELING DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDE KOEMELKPROVOCATIE

Verbreek de code: provocatie dag 1 was koemelk/placebo

provocatie dag 2 was koemelk/placebo

Eindbeoordeling provocatietest

provocatie met koemelk (positief, negatief of onbeslist)

provocatie met placebo (positief, negatief of onbeslist)

eindbeoordeling DBPGVP (positief, negatief of onbeslist)

Overleg met een gespecialiseerd centrum als de uitslag onbeslist is.

Een provocatie is geslaagd als ten minste 75% van de laatste provocatiedosis is ingenomen.

FOLLOW-UP DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDE KOEMELK-PROVOCATIE

Vervolgadvies en te ondernemen acties:

Koemelkvrij dieet handhaven (bij positieve test).

Koemelk thuis introduceren volgens schema (bij negatieve test).

Maak telefonische afspraak voor over een maand.

Bij onbesliste test verwijs naar (gespecialiseerde) 2e of 3e lijn.

Informeer de huisarts, consultatiebureauarts, kinderarts en diëtiste.

Schrijf rapportage.

Controle thuisintroductie

Controleer na een maand of melkproducten inderdaad zijn geïntroduceerd.

Wanneer de klachten opnieuw optreden kan de introductie worden gestaakt en na enige tijd weer worden hervat.

Introductie van melkproducten is probleemloos gegaan.

Bij de introductie van melkproducten zijn weer klachten opgetreden:

Toelichting

Verwijs als de klachten opnieuw optreden naar de kinderarts.